







Návrh klasifikace Českých nymf

V našem odborném tisku se sice už nejednou objevily úvahy, že by se měl najít nějaký způsob pro dělení Českých nymf a také návod pro správné pojmenování nových vzorů, ale nikdo se do tohoto nesnadného úkolu zatím nepustil. V předchozí kapitole jsem sice uvedl svůj vlastní pohled na skupinové členění Českých nymf, ale to má spíše význam při snadnější orientaci ve výběru vhodné mušky pro lov ryb. Co se týká vlastní klasifikace a tedy pojmenování jednotlivých nymf je však toto členění přeci jen obtížně použitelné.

Protože se stále objevují nové a nové vzory nymf, jejichž autoři ani neví jak je mají správně pojmenovat a jejichž názvy proto bývají často náhodné, pokusil jsem se navrhnout novou klasifikaci těchto mušek. Měla by umožnit snadnější a přesnější vytvoření jména nového vzoru ze skupiny Českých nymf a zároveň umožnit zařazení druhů již známých. Nejdříve jsem zkoušel vyjít z již existujících jmen, ale tento nápad jsem musel brzy zavrhnout z důvodu jejich praktické nepoužitelnosti pro vytvoření nějakého ucelenějšího systému.

Mnou navržená klasifikace vychází primárně z toho, jakou skupinu bezobratlých živočichů tyto nymfy imitují. Zvolený postup členění mušek však musíme chápat jinak, než jak je tomu v platném systému zoologickém. Naše mušky totiž nevznikly jako přírodní výtvoři, ale jako výplody lidské fantazie a šikovných rukou vazače. Každá nymfa je svým způsobem malým originálem a každá další malá modifikace by pak mohla být uznána jako nový druh, což by vůbec nepřispělo k zjednodušení celého problému. Jsem si také vědom různých nedokonalostí tohoto návrhu, který vám zde nyní přesto předkládám. České nymfy se tedy člení takto:



1. skupina:	Věrné napodobeniny larev chrostíků
	Jak plyne z názvu této skupiny jde o víceméně věrné napodobeniny larev chrostíků z rodu <i>Hydropsyche</i> . Jejich tělíčka jsou zelená či žlutozelená, hrudní část těla bývá tmavozelená až černá. Je zajímavé, že mezi tzv. věrnými napodobeninami larev chrostíků nebyl nalezen ani jeden zástupce, který by imitoval larvy z rodu <i>Ryacophila</i> . Pokud by se přesto takovýto případ mezi Českými nymfami vyskytl, pak by byl řazen právě do této skupiny.
2. skupina:	Boběšové
	Při vytvoření názvu této skupiny vycházíme z všeobecně uznávaného označení, do kterého jsem si dovolil zařadit pět samostatných „rodů“ těchto nymf. Uvedené mušky imitují larvální stádia chrostíků a řady dalších skupin vodního hmyzu se silnějším profilem tílka a poměrně početnými nožkami. Vnitřní členění této skupiny je následující: a) Bobeš – zavalitější nymfy s nožkami a přírodně zbarveným tělíčkem, u kterých se nevyskytuje výrazná tmavá (černá, tmavohnědá) hrud' b) Poustevník – zavalitější nymfy s nožkami a výraznou černou nebo tmavohnědou hrudí c) Fešák - zavalitější nymfy s nožkami a výraznějším vícebarevným tílkem d) Mrkváč – zavalitější nymfy v přírodních barvách s nožkami a s výrazným červeným nebo oranžovým kroužkováním e) Buzerant – zavalitější nymfy s nožkami a růžovým tílkem
3. skupina:	Divoáci
	Tato skupina Českých nymf není zatím příliš početná. Jedná se o zavalité nymfy bez nožek a v barvách, které se nevyskytují mezi žádnou přirozenou rybí potravou. Vzhledem k malému počtu druhů používám jejich stávající názvy, které se mi pro ně zdají být docela přiléhavé. Jako potenciální potrava ryb se uplatňují tvarem a profilem tílka. Jejich extrémní barevnost má vzbudit zájem u apatických ryb (viz 9. skupina z předchozí kapitoly).
4. skupina:	Ponravy
	Do této skupiny patří mnoho larev se silným a zavalitým tílkem a množstvím nejrůznější zátěže. Velké množství těchto nymf lze najít v recentní anglické muškařské literatuře pod označením Bug. Uvádím jen zde pro úplnost, protože v českých podmínkách se takovéto vzory příliš neuplatňují.
5. skupina:	Larvy
	Jedná se o mnoho různých druhů štíhlých Českých nymf, které jsou většinou bez početnějších nožek a s většinou jednobarevným tílkem. Může se také jednat o štíhlé a většinou beznohé varianty různých boběšovitých nymf a pak je klasifikuji jako larvy těchto původních a zavalitějších vzorů.
6. skupina:	Blešivci
	Jde o mnoho vzorů Českých nymf, které napodobují různé blešivce. Jejich malá tílka zpravidla příliš nepřesahují 1 cm a vyznačují se početnými nožkami podél celého břšního obvodu. Tyto nymfy jsou většinou jednobarevné, ale může se u nich vyskytovat i barevně odlišená hlavohrud.